

สรุปสาระสำคัญผลงานวิจัยเชิงสาธารณะ
กลุ่มสัตว์เศรษฐกิจจำนวน 8 โครงการ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

| ชื่อโครงการวิจัย | หัวหน้าโครงการ/ต้นสังกัด | ผลงานวิจัยโดยสรุป |
|---|---|---|
| 1. การค้นหาเครื่องหมายพันธุกรรมในการคัดเลือกลักษณะทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตโคไทยบราห์มัน | นายสมพร โชคเจริญ กรมปศุสัตว์ | 1. ได้เครื่องหมายพันธุกรรม จำนวน 4 ยีน ที่สามารถใช้เพื่อคัดเลือกกับลักษณะที่มีความสัมพันธ์ได้ โดยรูปแบบจีโนไทป์ที่เหมาะสมสามารถใช้เป็น marker ในการคัดเลือกลักษณะทางพันธุกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตโคไทยบราห์มัน ได้แก่ 1) Pituitary-specific transcription factor (<i>PIT1</i>) มีความสัมพันธ์กับน้ำนมแรกเกิด คือ รูปแบบจีโนไทป์ BB 2) Toll-like receptor 4 (<i>TLR4</i>) มีความสัมพันธ์กับน้ำนมหย่านม และน้ำนมเมื่ออายุ 1 ปี คือ รูปแบบจีโนไทป์ AB 3) Butyrophilin (<i>BTN1A1</i>) มีความสัมพันธ์กับน้ำนมหย่านม คือ รูปแบบจีโนไทป์ AB, AA 4) Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3 (<i>IGFBP-3</i>) มีความสัมพันธ์กับอายุเมื่อให้ลูกตัวแรก คือ รูปแบบจีโนไทป์ |
| 2. การทำนายคุณค่าทางโภชนาของพืชอาหารสัตว์ วัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS) | น.ส.จันทกานต์ อรณนันท กรมปศุสัตว์ | 1. สร้างสมการสำหรับเครื่อง NIRS เพื่อทำนายคุณค่าทางโภชนาได้แก่ ค่าวัตถุแห้ง โปรตีน ไขมัน เถ้า NDF, ADF, ADL, NDFD และ IVTDMD สำหรับวัตถุดิบอาหารสัตว์ 18 ชนิด (พืชอาหารสัตว์ วัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น ข้าวปาล์ม น้ำมัน สับปะรด) รวม 171 สมการ เป็นสมการที่สามารถใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่เกษตรกร นักอาหารสัตว์และนักวิชาการเพื่อใช้ข้อมูลในการประกอบสูตรอาหารสัตว์และงานวิจัยได้ในระดับดีถึงยอดเยี่ยม รวม 125 สมการ และต้องปรับปรุงต่อไป 46 สมการ 2. ประเมินศักยภาพของสมการตามมาตรฐาน ISO12099:2017 ค่า bias SEP และ slope ผ่านมาตรฐาน แสดงว่าสมการที่สร้างขึ้นมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำไปวิเคราะห์ประจำวันเพื่อทำนายคุณค่าทางโภชนาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ |
| 3. การคัดเลือกระยะปลูกและสายพันธุ์ถั่วลิสงที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ด และต้นถั่วลิสงแห้ง | นายทรงยศ โชติชุติมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 1. การปลูกถั่วลิสงสายพันธุ์ KUP13W027 ร่วมกับระยะแคบ (ระยะระหว่างแถวประมาณ 15 ซม. และระยะระหว่างต้น 10 ซม. หยอดหลุมละ 1 เมล็ด) ให้ผลผลิตฝัก และเมล็ดแห้ง (514.70 และ 333.74 กิโลกรัม/ไร่) มากกว่าพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 |

| ชื่อโครงการวิจัย | หัวหน้าโครงการ/ต้นสังกัด | ผลงานวิจัยโดยสรุป |
|--|--|--|
| อาหารสัตว์บนพื้นที่นาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | | <p>ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบกับที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และ สกลนคร นอกจากนี้ ยังให้ผลผลิตโดยรวมต้นแห้ง (1,563 กิโลกรัม/ไร่) มากกว่าพันธุ์เปรียบเทียบกับทั้งสองพันธุ์ ส่วนน้ำหนักเมล็ด 100 เมล็ดที่ได้จากสายพันธุ์ KUP13W027 มีขนาดเมล็ดที่เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรม (35-60 กรัม/100 เมล็ด)</p> <ol style="list-style-type: none"> ด้านคุณค่าทางโภชนาของถั่วลิสง ระยะปลูกไม่ทำให้คุณค่าทางโภชนาแตกต่างกัน การแบ่งชั้นคุณภาพพืชแห้งตามปริมาณโปรตีนหยาบพบว่า ใบถั่วลิสงแห้งอยู่ในระดับคุณภาพดีจนถึงดีมาก ขณะที่ส่วนต้นแห้งอยู่ระดับปานกลางจนถึงคุณภาพดี การปลูกสายพันธุ์ KUP13W027 ร่วมกับระยะปลูกแคบที่มีความเหมาะสมกับการใช้เป็นถั่วลิสงเอนกประสงค์ ซึ่งไม่เพียงให้ทั้งผลผลิตเมล็ดดีและผลผลิตชีวมวลส่วนใบรวมต้นมาก แต่ยังสามารถต้านทานโรคยอดไหม้ได้ |
| 4. การสำรวจโรคติดเชื้อโคโรนาและโควิด 19 ในปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ | ศ.ดร.อลงกร อมรศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | <ol style="list-style-type: none"> ได้ข้อมูลสถานการณ์ชนิดการกระจายตัวรหัสพันธุกรรม และความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาและโควิด 19 ในปศุสัตว์สัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยเก็บตัวอย่าง จำนวน 2,145 ตัวอย่าง ประกอบด้วย สุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สุนัขและแมว และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้วิธีตรวจพิสูจน์เชื้อไวรัสโคโรนาและโควิด 19 และถอดรหัสพันธุกรรมและวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมบริเวณ spike gene ของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้ข้อมูลประเมินความเสี่ยงและสื่อสารความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยประเมินความเสี่ยงจากความชุก การกระจายตัว ชนิด และลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสในแต่ละชนิดสัตว์ตามวิธีการจัดทำ Risk assessment framework ตามวิธีของ OIE (World Organization for Animal Health) และสามารถนำมาใช้ในการวางแผนในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาในสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และมนุษย์ได้ จัดเสวนาในรายการ ARDA Talk เรื่อง การสำรวจการติดเชื้อโควิด 19 ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผ่าน Facebook สวก. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 |
| 5. การสร้างวิธีตรวจสุขภาพกุ้ง เพื่อคัดพ่อแม่พันธุ์และลูกกุ้งที่ทนต่อโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว | นายศุภรัตน์ แดงชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | <ol style="list-style-type: none"> โปรตีนที่มีบทบาทสำคัญในกลไกการทนต่อเชื้อไวรัส จำแนกตามหน้าที่ได้ 3 กลุ่มย่อย คือ Antimicrobial peptides, Antioxidant และ heat shock response |

| ชื่อโครงการวิจัย | หัวหน้าโครงการ/ต้นสังกัด | ผลงานวิจัยโดยสรุป |
|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> ผลการตรวจตัวชี้วัดสุขภาพกุ้ง โดยวัดกิจกรรมของเซลล์เม็ดเลือดพบว่า มีตัวชี้วัดอย่างน้อย 2 ตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับกุ้งที่ทนต่อเชื้อไวรัสได้ดี คือ ค่ากิจกรรมโปรตีน ี นอลออกซิเดส (ProPO) และค่ากิจกรรม phagocytosis ของเซลล์เม็ดเลือดกุ้ง การตรวจวัดปริมาณโปรตีนด้วยเทคนิค ELISA พบว่า ปริมาณโปรตีน กลุ่ม antimicrobial peptide และ antioxidant enzyme จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกุ้งที่เคยติดเชื้อและยังรอดตาย และพบว่า โปรตีน C3761 (SOD) จะมีปริมาณมากสัมพันธ์กับลูกกุ้งชุดที่มี แนวโน้มทนต่อเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวได้ดีที่สุด การวัดปริมาณโปรตีนกลุ่มสารต้านจุลชีพ ไม่สามารถบ่งชี้ถึงกลุ่มที่ทน ต่อเชื้อไวรัสได้ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าในกรณีที่กุ้งยังไม่ติดเชื้อไวรัส โปรตีนกลุ่มนี้อาจจะไม่ถูกกระตุ้นให้มีการแสดงออก ซึ่งอาจจะ นำไปใช้ในกรณีที่ต้องการประเมินวิธีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่จำเพาะ กับเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว โดยพิจารณาจากการเพิ่มปริมาณของ โปรตีนชุด AMPs |
| <p>6. การสะสมไมโครพลาสติก ในสัตว์ไม่มีกระดูกสัน หลังบางชนิดในชายฝั่ง ทะเลประเทศไทย</p> | <p>นางสาวสมฤดี ศิลลาฤดี มหาวิทยาลัยศิลปากร</p> | <ol style="list-style-type: none"> ผลการวิเคราะห์ไมโครพลาสติกในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 4 ชนิด ได้แก่ หอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยเสียบ และปูม้า ในฤดูมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณทะเลอันดามัน อ่าวไทยตอนนอกอ่าวไทยตะวันตก และอ่าวไทยตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 34 แห่ง พบไมโครพลาสติกในหอยแมลงภู่มากที่สุด โดยในช่วงลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ พบมากที่สุดในหอยแมลงภู่ที่เก็บบริเวณนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง และในช่วงลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือพบมากที่สุดในหอยแมลงภู่ที่เก็บบริเวณหาด ชะอำ จ.เพชรบุรี ปริมาณไมโครพลาสติกในหอยนางรม พบมากที่สุดบริเวณหาดป่า ตอง จ.ภูเก็ต ในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และบริเวณหาดชะอำ จ.เพชรบุรี ในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณไมโครพลาสติกในหอยเสียบ พบมากบริเวณหาดชะอำ จ.เพชรบุรี ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นเดียวกับ หอยแมลงภู่และหอยนางรม การสะสมไมโครพลาสติกของปูม้า พบในลำไส้มากกว่าเหงือก และ ไม่พบในกล้ามเนื้อ โดยพบในปูม้าเพศเมียมากกว่าเพศผู้ และพบใน ปูม้าขนาดกลางมากกว่าปูม้าขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ |
| <p>7. การศึกษาเปปไทด์ต้าน ไวรัสจากซีรัมของจระเข้</p> | <p>รศ.ดร.จิตรกมล ธนศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> | <ol style="list-style-type: none"> ทดสอบการออกฤทธิ์ของเปปไทด์และโปรตีนไฮโดรไลเสต จากซีรัม จระเข้ น้ำจืดและเหี่ยวในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโคโรนา |

| ชื่อโครงการวิจัย | หัวหน้าโครงการ/ต้นสังกัด | ผลงานวิจัยโดยสรุป |
|---|---|---|
| <p>น้ำจืดพันธุ์ไทย (<i>Crocodylus siamensis</i>) และหมี (<i>Varanus salvator</i>)</p> | | <p>สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID19; SARS-CoV-2) ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Human H1N1) และไวรัสไข้หวัดนก (Avian influenza virus) ทั้งชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI H5N1) และ ชนิดก่อโรคไม่รุนแรง (LPAI H1N1) โดยวิธี Plaque assay พบว่า ที่ระดับความเป็นพิษต่อเซลล์ ร้อยละ 50 เปปไทด์และโปรตีนไฮโดรไลเสต ที่ได้จากซีรัมจระเข้ และหมี มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 และไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และไวรัสไข้หวัดนกทั้งสองสายพันธุ์</p> |
| <p>8. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ล ้า เชื้อ เฮเทอโรโทรฟิกไนตริไฟ อิงแบคทีเรียทนเค็ม สำหรับบำบัดสาร อนินทรีย์ไนโตรเจนใน ระบบการเลี้ยงกุ้ง</p> | <p>นายยุทธพงษ์ สังข์น้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้เฮเทอโรโทรฟิกไนตริไฟอิงแบคทีเรียทนเค็มได้ จำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ <i>Alcaligenes faecalis</i> SRNB23, <i>A. faecalis</i> SRNB35, <i>Bacillus oceanisediminis</i> Ba9 และ <i>B. vietnamensis</i> SF-1 2. กล้าเชื้อผสมระหว่าง <i>B. oceanisediminis</i> Ba9 และ <i>B. vietnamensis</i> SF-1 มีความสามารถในการกำจัดแอมโมเนียสูงสุดเมื่อศึกษาในระดับพลาสม์ 3. แหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจนที่เหมาะสมที่สุดของสายพันธุ์ <i>B. oceanisediminis</i> Ba9 และ <i>B. vietnamensis</i> SF-1 คือ sucrose และ ammonium sulfate ตามลำดับ 4. สัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการกำจัดแอมโมเนีย <i>B. oceanisediminis</i> Ba9 และ <i>B. vietnamensis</i> SF1 มีค่าเท่ากับ 4 และ 8 ตามลำดับ 5. เมื่อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อเฮเทอโรโทรฟิกไนตริไฟอิงแบคทีเรียทนเค็มทั้งสองชนิดนี้แบบสูตุน้ำ (สัดส่วน 50:50) ในการเลี้ยงกุ้งจริงเป็นระยะเวลา 91 วัน ให้ผลในการลดปริมาณแอมโมเนียได้ดีกว่าบ่อที่มีการเติมผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อ ปม.1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ |